

## 追加接種を希望される皆さんへ

新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。ご本人が希望する場合に限り接種を行うことになります。また、接種を希望しない方に対して接種を強要したり行動制限を求めること、同調圧力をかけること、さらに、差別することなど決してあってはなりません。


### ～南出市長からのメッセージ～



令和5年秋接種から使用するオミクロンXBB対応型ワクチンは、厚生労働省の資料によりますと、「中和抗体の上昇により、重症化予防効果が期待されると考えられる」と明記されていますが、マウスを用いた非臨床試験のみの限られた知見です。また、ワクチン接種開始当初から、中長期的な人体への影響は明らかになっておらず、最近では、免疫機能の低下等、追加接種による人体への影響についても心配されています。

また、海外では昨年春以降追加接種はあまり進んでいない状況です。

ウイルスは変異を繰り返しています。現在流行しているウイルスの特徴なども確認し、自ら情報収集し、極めて慎重に判断してください。また、ワクチン接種には副反応などのリスクも生じます。下記副反応のデータを参考に、極めて慎重に判断してください。



## 1. 国内における新型コロナワクチンの副反応疑いについて

ワクチン別副反応報告件数（医療機関からの報告分）※令和5年7月28日厚生科学審議会資料を基に作成

	副反応疑い 報告数 (報告頻度)	うち	
		重篤 報告数 (報告頻度)	死亡 報告数 (報告頻度)
ファイザー (総数)	30,703 (0.0104%)	7,278 (0.0025%)	1,388 (0.0005%)
小児用 ファイザー	146 (0.0034%)	41 (0.0010%)	3 (0.0001%)
乳幼児用 ファイザー	8 (0.0018%)	3 (0.0007%)	1 (0.0002%)
モデルナ (総数)	5,542 (0.0066%)	1,293 (0.0015%)	178 (0.0002%)
ノババックス	42 (0.0132%)	12 (0.0038%)	1 (0.0003%)

※ファイザー社（推定接種回数）  
：小児・乳幼児含む 298,924,259回  
※モデルナ社（推定接種回数）3,462,033回  
※接種開始日（ファイザー：R3.2.17 モデルナ：R3.5.22）以降の累計報告件数

※医療機関または製造販売業者から死亡として報告された事例は、ファイザー社製ワクチンで1,843件、小児用ファイザー社製ワクチンで3件、乳幼児用ファイザー社製ワクチンで1件、モデルナ社製ワクチンで225件、武田薬品工業社製ワクチン（ノババックス）で7件となっています。  
なお、製造販売業者からの報告によると、副反応疑い報告数（重篤）は、27,361件あります。

※なお、インフルエンザワクチン（令和3年10月から令和4年3月）での医療機関または製造販売業者からの報告によると、5,195回接種で重篤な副反応が50件、死亡事例が7件となっています。

**「ウィズコロナからアフターコロナの健康づくりシンポジウム」動画 (R5.7.22開催)**

- 世界の接種状況について
- XBB対応型ワクチンについて
- ワクチン等の最新事実について
- 免疫力をあげるからだづくりについて

**ワクチンの安全性と副反応については、こちら(市HP)をご覧ください。**

## 2. 接種後、起こることがある症状（下記以外にも副反応の症例だけで1,000種類以上報告されています。）

### ●アナフィラキシー

- アナフィラキシーとは、じんましんや赤み、かゆみなどの皮膚の症状、くしゃみや咳、息苦しさなどの呼吸器の症状など複数の症状が短時間にあらわれるアレルギー症状のことです。このアナフィラキシーによって、生命を脅かす危険な状態になることをアナフィラキシーショックといいます。
- ショックやアナフィラキシーが接種で認められた場合、接種は受けられません。
- アナフィラキシーの既往や重度のアレルギー症状がある方は、接種前に必ずかかりつけ医にご相談したうえで、接種するかどうか決めてください。

### ●血管迷走神経反射（けっかんめいそうしんけいはんしゃ）

- ワクチンを受けたことに対する緊張や痛みをきっかけに、血の気が引いて、立ちくらみがしたり、気を失ったりすることがあります。横になって休めば、自然に治ります。たおれてケガをしないよう、背もたれのあるイスですわって休んでください。

### ●心筋炎（しんきんえん）・心膜炎（しんまくえん）

- ワクチン接種後4日程度の中に、胸の痛み、動悸（どうき）、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

### ●ギラン・バレー症候群（ギランバレーしょうこうぐん）

- 接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

## 3. 免疫力をあげるからだづくり

新型コロナウイルス感染症など、感染対策の基本は、自身の免疫力をあげることが重要です。免疫力とはウイルス感染やがんなどの病気を防御してくれる機能です。身を守る一つの方法として、下記を参照に実践し、免疫力アップを目指しましょう。

また、健康を維持するには、体に必要ないもの（食品添加物や農薬など）はできるだけ摂らず、必要な栄養素をしっかり摂取する食生活を心がけましょう。

### 免疫力アップ



- ①栄養バランスのとれた食事
- ②からだを温める
- ③睡眠をとる
- ④ストレスを減らす
- ⑤腸を整える
- ⑥適度な運動

- ①栄養バランスの良い食事と、からだに不要なものは、摂らないことを意識しましょう。
- ②体温が上がると血流が良くなり免疫力が高まります。
- ③良質な睡眠により、免疫を活性化させるホルモンが分泌されます。
- ④ストレスにより自律神経のバランスが崩れると免疫力が弱まります。
- ⑤免疫細胞の約7割が腸にあり！発酵食品や食物繊維などで腸を整えましょう。
- ⑥激しい運動は逆効果。自分の身体にあった中軽度の運動を心がけましょう。

「健康づくり推進条例制定記念シンポジウム」動画

～未病予防対策先進都市をめざして～(R5.8.6開催)

・未病の成り立ちと食事による予防法

・身体の土台づくりとしての呼吸と足指  



## 4. 新型コロナワクチンの副反応の相談・健康被害支援金について

### ▷オンライン相談

新型コロナ感染症の後遺症にお悩みの方やワクチンの副反応などにお悩みの方は西洋医学だけでなく、東洋医学など幅広い知識と専門性を有する医師が個別に対応します。（泉大津市民無料）

### ▷後遺症改善プログラム

統合医療に造詣の深い医師らが立ち合い、自然療法をはじめヨガや整体などの技術を用いて自己治癒力を高め、症状の緩和改善を目指しますプログラムです。（泉大津市民無料）

### ▷ワクチン接種後の体調不良や長引く副反応に関する相談・診療窓口

相談：泉大津市 健康づくり課（☎0725-33-8181 平日8:45～17:15）

診療：市内6医療機関が対応しています（保険診療。かかりつけ医療機関がある方は、まずは主治医にご相談ください。）

「相談窓口・関連リンク」

### ▷新型コロナワクチン健康被害支援金

新型コロナワクチン接種後に副反応（副反応疑いを含む）などで健康被害を生じ、国の予防接種後健康被害救済制度の申請をされる方を対象に、申請までにかかった医療費等の費用の一部を市独自の「支援金」として支給します。

お問い合わせ先：泉大津市 健康づくり課（保健センター）（☎0725-33-8181 平日8:45～17:15）



新型コロナワクチン 9月20日から生後6カ月以上の全年齢を対象

# XBB対応型mRNAワクチン 接種は百害あって一利なし!



**重篤な副反応が起きる?** これまでのコロナワクチンより毒性が強い可能性大!

**予防効果はない?** 現在はEG.5株が主流。古いXBB株対応ワクチンを打つ意味なし!

**人体への投与は日本人が初!** XBB対応型ワクチンはマウスでの治験のみ!

**武漢株の抗体のみ上昇** 既接種者はこのワクチンを打っても武漢株抗体しかできない!

ファイザー社は抗体が上がっているように見せる印象操作をしています!



出典: FDA, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee June 15, 2023 Meeting Announcement 資料より

※実際にはXBBに対する抗体はほぼ上がらずXBB株には効果が見込めません。厚生労働省ではこの対数グラフ(左の図)が採用されています。

**! コロナワクチンにより多くの方が亡くなり甚大な健康被害が発生しています!**

## 厚生労働省発表 コロナワクチン接種後の副反応疑い報告状況

ワクチン接種後の死亡者 **2,076人**  
(2023年7月28日厚生労働省発表4月30日までの報告分)


副反応(健康被害)の報告者 **36,457人**  
(医療機関からの副反応疑い報告:2023年7月28日厚生労働省発表)

第94回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(2023年7月28日)「医療機関からの副反応疑い報告状況について」より

### 予防接種健康被害救済制度の認定数の比較

	過去44年間のワクチン被害認定 (統計期間:1977年2月~2021年12月)	コロナワクチン被害認定 (統計期間:2021年2月~)
総認定数	3,522件	4,098件 (2023年8月31日時点)
死亡認定数	151件	210件 (2023年8月31日時点)

データ元:厚生労働省(2023年8月31日)発表



コロナワクチン被害の認定数は過去約44年間の全てのワクチンの被害認定総数を超えています!

ご自身で情報を得るように努めましょう! 下記の団体では最新の情報を発信しています。

## 東北有志医師の会

新型コロナウイルスワクチン接種事業の中止  
ワクチン被害者の救済を目指す  
医師・医療従事者の非営利団体  
<https://tohokuishi.localinfo.jp>

## 「XBB対応型ワクチンの危険性」の動画

XBB対応型mRNAワクチンの危険性について  
分かりやすく説明された動画(ニコニコ動画)です。  
接種を検討される前に是非ご視聴下さい!




QRコードをスマートフォンのQRコードリーダーで読み取ると動画を見ることができます。

監修:東北有志医師の会 発行:mRNAワクチン問題を追求する有志の会


# 全国の死者数

## 人口動態統計速報




# 全国の死者数

人口動態統計速報




# 全国の死者数

## 人口動態統計速報



# 全国の死者数

## 人口動態統計速報



(意見書案第9号)

新型コロナウイルスワクチンの小児接種における慎重な対応を求める意見書

新型コロナウイルス感染症はウイルス変異を繰り返し弱毒化の傾向も見られ、重症化するケースが減少していることから、令和5年5月8日に新型インフルエンザ等感染症（2類相当）から5類感染症に位置づけが変更となった。

一方、ワクチン接種による後遺症患者は日々増加し、その因果関係を不明と判断されるなど多くの国民が苦しんでいる現状がある。

このような状況の中、厚生労働省はワクチンの小児接種を「推奨」とし、対象年齢は生後6か月以上と懸念が拭えない状態である。

そもそも治験中で中長期的な副反応も確認されていないワクチンを、感染しても極めてリスクの低い子どもに接種する理由はどこにあるのか疑問であるとともに、保護者が適切に判断をすることができるように十分な情報提供を行うべきである。

よって、国においては、子どもの健康と生命を守るために、新型コロナウイルスワクチンの接種に関して下記の措置を講じるよう強く要望する。

記

- 1 子どもへのワクチン接種は強制ではなく義務でもないこと。また、本人・保護者が正しい情報を取得した上で判断できるよう十分に周知すること。
- 2 厚生労働省のホームページで公表されている副反応疑い事例について、保護者が十分に理解できるよう、広報などを使って情報提供を行うこと。
- 3 ワクチン接種前に問診票を用いて、上記の情報提供内容を理解しているのか保護者に対して確認すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年6月30日

釧路市議会

衆議院議長  
参議院議長  
内閣総理大臣  
文部科学大臣  
厚生労働大臣

宛